

PŘÍKLAD PLÁNU PRO ŘÍZENÍ HYGIENY

POUŽITÍ ▼	TÝDEN FÁZE RŮSTU				TÝDEN FÁZE KVĚTU							
	Propagátor	1.	2.	3.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. — Závěrečný týden	Hloubkové čištění
Dezinfekce rukou	před každým kontaktem a při změně prostor											
Purolyt pro dezinfekci povrchů a vzduchu (postřik/rozprašování)	4x týdně 20 ml/l	3x týdně 20 ml/l			2x týdně 20 ml/l							20 ml/l
Purolyt pro dezinfekci nářadí a nástrojů (postřik a ponožování)	Před a po každém použití: 20 ml Purolytu na jeden litr vody											
Purolyt pro dezinfekci vodních nádrží, provozní teplota > 23 °C (přímé použití)	Prevence: 2x týdně 5–10 ml Purolytu na deset litrů vody											40 ml/10 l
Purolyt pro dezinfekci nádrží s vodou, provozní teplota < 23 °C (přímé použití)	Prevence: 1x týdně 5–10 ml Purolytu na deset litrů vody											40 ml/10 l
Purolyt k dezinfekci/opětové použití inertních substrátů (namáčení)	Před každým vegetačním cyklem 10 ml/l											
Odstraňování odumřelých rostlinných materiálů	Bezodkladně											
Vysávání	1x týdně											
Čištění klimatizačních zařízení	1x měsíčně											

Poznámka: Postřik nebo aplikace mlžením by měly být vždy prováděny na konci světelného cyklu za snížené intenzity osvětlení. Zabraňte přístupu slunečního světla nebo UV záření.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.